

Fait du jour : Du nouveau dans le dépistage du VIH

Exercices

Exercice 1 – Un nouveau test en pharmacie. Entourez la bonne réponse entre les expressions équivalentes en fonction de ce que vous entendez.

Et puis, les associations **l'attendaient / l'espéraient** depuis plusieurs mois.

Dès la fin juin, des autotests de dépistage du **sida / VIH** [...]

[...] seront **en vente / disponibles** dans les pharmacies.

Il sera donc possible de tester **soi-même / tout seul** sa séropositivité [...]

[...] à partir **d'un petit prélèvement / d'une goutte** de sang.

Exercice 2 – Un autotest pour tous. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.

Il existait déjà les TROD, les tests **de sensibilisation / d'orientation** au diagnostic rapide, [...]

[...] disponibles auprès des **associations de lutte contre / centres spécialisés sur** le sida.

L'autotest sera lui accessible à **un public peu sensibilisé, / un plus large public**, [...]

[...] au prix de **18 / 28** euros.

Exercice 3 – Le kit et le mode d'emploi. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.

Dans le kit on trouve une lingette et :

- ☐ un désinfectant.
- ☐ un pansement.

Le kit comprend également :

- ☐ une aiguille.
- ☐ une lame.

Pour faire le test, il faut se piquer :

- ☐ le lobe de l'oreille.
- ☐ le bout du doigt.

Ensuite il faut attendre :

- ☐ un quart d'heure.
- ☐ une demi-heure.

Le résultat est positif si :

- ☐ une barre s'affiche.
- ☐ deux barres s'affichent.

Exercice 4 – Réactions des médecins et des associations. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.

Que disent les médecins ?

- ☐ Ce test n'est pas vraiment fiable.
- ☐ Ce test est seulement une étape du diagnostic complet.

Que faut-il faire si le résultat est positif ?

- ☐ une prise de sang
- ☐ prendre rendez-vous chez un médecin

Pourquoi ?

- ☐ pour se faire rembourser le test
- ☐ pour vérifier le résultat du test

Que pensent les associations de lutte contre le sida ?

- ☐ Ces autotests sont très utiles.
- ☐ Ces autotests devraient être moins chers.

Pourquoi ?

- ☐ Ils vont encourager les gens à faire le test.
- ☐ Les centres de diagnostics sont débordés.

Qu'apprend-on sur les personnes contaminées en France ?

- ☐ Il y a toujours de nombreuses contaminations chaque année.
- ☐ Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont malades.

Exercice 5 – Deuxième écoute. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.

Pour acheter le test, on n'aura pas besoin d'aller voir le médecin avant.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

L'autotest sera bientôt en vente dans toutes les pharmacies européennes.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Le nouveau test de dépistage rappelle un test d'alcoolémie dans son apparence.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Le test est très fiable, même si l'infection est très récente.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Si le test est positif, il est recommandé de consulter un médecin pour pouvoir être rapidement pris en charge.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Transcription

Zéphyrin Kouadio :

Et puis, les associations l'attendaient depuis plusieurs mois. Dès la fin juin, des autotests de dépistage du VIH [**NDLR : virus de l'immunodéficience humaine**] seront disponibles sans ordonnance dans les pharmacies françaises.

François Bernard :

Il sera donc possible de tester soi-même sa séropositivité à partir d'une goutte de sang, nous dit Alice Pozycki.

Alice Pozycki :

Il existait déjà les TROD, les tests d'orientation au diagnostic rapide, disponibles auprès des associations de lutte contre le sida. L'autotest sera lui accessible à un plus large public, au prix de 28 euros.

Une lingette, un pansement, une aiguille et le fameux test qui ressemble plus ou moins à un test de grossesse, voilà le kit qui permettra à chacun de se dépister soi-même.

Une piqûre sur le bout du doigt et 15 minutes plus tard, le résultat s'affiche : une barre si c'est positif, deux barres, si négatif.

Cet autotest français promet une fiabilité proche des 100 %, à condition que l'infection date d'au moins trois mois.

Mais l'autotest n'est qu'une étape, il ne constitue pas un diagnostic complet rappellent les médecins. Le dépistage doit être suivi d'une prise de sang, pour confirmer le résultat et ainsi commencer un traitement rapidement.

Pour les associations de lutte contre le sida ces autotests sont précieux, ils permettront de banaliser le dépistage du VIH, car aujourd'hui encore en France, 28 000 personnes ignorent être séropositives.

Exercices corrigés**Exercice 1 – Un nouveau test en pharmacie. Entourez la bonne réponse entre les expressions équivalentes en fonction de ce que vous entendez.**

Et puis, les associations / **l'attendaient** / l'espéraient / depuis plusieurs mois.

Dès la fin juin, des autotests de dépistage du / sida / **VIH** / [...]

[...] seront / en vente / **disponibles** / dans les pharmacies.

Il sera donc possible de tester / **soi-même** / tout seul / sa séropositivité [...]

[...] à partir / d'un petit prélèvement / **d'une goutte** / de sang.

Exercice 2 – Un autotest pour tous. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.

Il existait déjà les TROD, les tests / de sensibilisation / **d'orientation** / au diagnostic rapide, [...]

[...] disponibles auprès des / **associations de lutte contre** / centres spécialisés sur / le sida.

L'autotest sera lui accessible à / un public peu sensibilisé, / **un plus large public**, / [...]

[...] au prix de / 18 / **28** / euros.

Exercice 3 – Le kit et le mode d'emploi. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.

Dans le kit on trouve une lingette et :
un désinfectant.

☒ un pansement.

Le kit comprend également :

☒ une aiguille.

☐ une lame.

Pour faire le test, il faut se piquer :

le lobe de l'oreille.

☒ le bout du doigt.

Ensuite il faut attendre :

☒ un quart d'heure.

☐ une demi-heure.

Le résultat est positif si :

☒ une barre s'affiche.

☐ deux barres s'affichent.

Exercice 4 – Réactions des médecins et des associations. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.

Que disent les médecins ?

Ce test n'est pas vraiment fiable.

☒ Ce test est seulement une étape du diagnostic complet.

Que faut-il faire si le résultat est positif ?

☒ une prise de sang

☐ prendre rendez-vous chez un médecin

Pourquoi ?

☐ pour se faire rembourser le test

☒ pour vérifier le résultat du test

Que pensent les associations de lutte contre le sida ?

☒ Ces autotests sont très utiles.

Ces autotests devraient être moins chers.

Pourquoi ?

☒ Ils vont encourager les gens à faire le test.

Les centres de diagnostics sont débordés.

Qu'apprend-on sur les personnes contaminées en France ?

Il y a toujours de nombreuses contaminations chaque année.

☒ Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont malades.

Exercice 5 – Deuxième écoute. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.

Pour acheter le test, on n'aura pas besoin d'aller voir le médecin avant.

☒ Vrai

Faux

*Commentaire : Dès la fin juin, des autotests de dépistage du VIH seront disponibles **sans ordonnance**.*

L'autotest sera bientôt en vente dans toutes les pharmacies européennes.

Vrai

☒ Faux

*Commentaire : Dès la fin juin, des autotests de dépistage du VIH seront disponibles [...] **dans les pharmacies françaises**.*

Le nouveau test de dépistage rappelle un test d'alcoolémie dans son apparence.

Vrai

☒ Faux

*Commentaire : **Le fameux test qui ressemble plus ou moins à un test de grossesse**.*

Le test est très fiable, même si l'infection est très récente.

Vrai

☒ Faux

*Commentaire : Cet autotest français promet une fiabilité proche des 100 %, **à condition que l'infection date d'au moins trois mois**.*

Si le test est positif, il est recommandé de consulter un médecin pour pouvoir être rapidement pris en charge.

☒ Vrai

Faux

*Commentaire : Le dépistage doit être suivi d'une prise de sang, pour confirmer le résultat **et ainsi commencer un traitement rapidement**.*